

STALEVO (entacapone/levodopa/carbidopa) e possibile rischio di cancro alla prostata

STALEVO : CANCRO alla PROSTATA

L' FDA sta valutando i dati forniti da un *trial* clinico di lunga durata (Stalevo Reduction in Dyskinesia Evaluation-Parkinson's Disease, STRIDE-PD) che sembrano suggerire, per i pazienti che assumono Stalevo, farmaco per il trattamento della malattia di Parkinson, un possibile incremento del rischio di sviluppare cancro alla prostata. Dallo studio, che ha arruolato un totale di 745 pazienti, è emersa un'incidenza di cancro alla prostata di 14 casi/1000 pazienti anno per Stalevo e 3,2 casi/1000 pazienti per carbidopa/levodopa. Al momento la revisione della FDA è ancora in corso e non ci sono conclusioni o raccomandazioni relative all'uso di questo farmaco.

I medici dovrebbero essere informati di questo possibile rischio e seguire le attuali linee guida per lo *screening* del cancro alla prostata. I pazienti non dovrebbero interrompere il trattamento a meno che non siano consigliati dal loro medico.

Fonte: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm206363.h>, FDA. 31 marzo 2010